

A NEW VARIETY OF *IXODES PILOSUS* (Koch).

BY J. G. NEUMANN

(*Professor à l'École vétérinaire de Toulouse*).

(Read June 17, 1908.)

*IXODES PILOSUS HOWARDI*, n. subsp.

*Male*.—Semblable au type spécifique, mais un peu plus petit; 2 mm. 3, de longueur sur 1 mm. 2 de largeur, au lieu de 3 mm. 15 sur 1 mm. 6.

*Femelle*.—Diffère du type spécifique par les caractères suivants:—

Écusson dorsal plus long (1 mm. 27) que large (1 mm. 1), ovale; sillons cervicaux et latéraux moins marqués; ponctuations plus fines, moins profondes, plus nombreuses, Poils moins abondants sur les faces dorsale et ventrale. Sillon anal a branches plus rapprochées et formant une ellipse ouverte en arrière. Rostre plus faible, long de 0 mm. 7 (au lieu de 0 mm. 85 dans le type spécifique); aires poreuses plus petites, moins profondes, plus écartées. Pattes bien plus faibles, surtout dans les hanches. Couleur générale (à jeun) rouge orangé.

D'après 2 males et 12 femelles recueillis sur le Chien à Leydsdorp (Transvaal), et à Durban (Natal), par C. W. Howard (de Prétoria).